

『Multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes
- how much can be gained and how low should we go?』

The importance of intensified multifactorial intervention targeting hyperglycemia, hypertension, dyslipidemia, and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes in reducing the risk for mortality, cardiovascular and microvascular disease has beyond doubt been demonstrated in the Steno-2 study.

However, the role of intensified glucose lowering has been challenged in the ACCORD trial stopping the glucose arm prematurely due to excess mortality with intensive therapy.

Also, the blood pressure and lipid studies from ACCORD have been published with no significant impact on cardiovascular disease of intensified blood pressure lowering treatment, and no extra benefits of adding a fibrate to statin treatment.



第53回 日本糖尿病学会年次学術集会
ランチョンセミナー 14

**Multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes
- how much can be gained and how low should we go?**

座長

佐倉 宏 先生

東京女子医科大学 糖尿病センター 准教授

日時

**2010年5月27日(木)
12:30~13:20**

演者

Peter Gæde, MD, DMSci

Chief physician
Department of Endocrinology
Slagelse Hospital and
Steno Diabetes Center
Denmark

会場

**第16会場
（ラヴィール岡山
5F「シャンティの間」）**

〒700-0024 岡山市北区駅前元町1-10

本セミナーは事前予約制でございます。
ご予約がお済みの方から優先的にご入場いただけます。
詳細は当日ご確認ください。

共催：第53回日本糖尿病学会年次学術集会
ファイザー株式会社
アステラス製薬株式会社

SOT22A115A